

Ixobrychus minutus **Tarabusino**

Metodo di censimento: punti d'ascolto per censimento al canto (con utilizzo di richiami acustici).

Protocollo di monitoraggio: esecuzione di punti d'ascolto della durata di 10' così strutturati: 5' di ascolto, in caso di mancato contatto con la specie emissione del canto del maschio per 1' (interrompere in caso di risposta), seguito da 4' di ascolto. In caso di aree di grande estensione, sono raccomandati più punti di ascolto, che devono essere distanziati circa 300 m l'uno dall'altro. Presso ogni punto, si devono contare gli individui sentiti/osservati, distinguendo quando possibile tra maschi, femmine ed eventuali giovani.

Area di campionamento: la cartografia in formato digitale delle aree da sottoporre a campionamento sarà scaricabile dal sito dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia.

La nidificazione avviene principalmente all'interno di zone umide, sia naturali che semi-naturali, talvolta artificiali. La specie è presente prevalentemente in aree a bassa quota; le densità sono spesso basse.

Periodo di monitoraggio: 1 maggio – 30 giugno.

Orari e condizioni per il monitoraggio: uscite da svolgersi da mezz'ora prima a due ore dopo l'alba (calcolo delle effemeridi disponibile al seguente link http://www.ornitho.it/index.php?m_id=116).

N° di uscite: 2 uscite per sito separate da non meno di 10 giorni tra maggio e il 15 giugno. Eventuale terza uscita entro giugno in caso di nessun contatto nelle prime due uscite.

Periodicità: annuale.

Attrezzatura consigliata: binocolo, riproduttore canti, GPS, eventuale piccola imbarcazione per raggiungere determinati siti di censimento.

Organizzazione e invio dati: per ogni stazione di campionamento e in relazione ad ogni uscita effettuata i dati dovranno essere riportati nella scheda scaricabile dal sito dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia. Al termine della stagione di campionamento le schede compilate dovranno essere spedite a fauna@biodiversita.lombardia.it. Si raccomanda di inserire il dato anche nel database dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia e in [ornitho.it](http://www.ornitho.it).

Avvertenze: nelle possibili aree di presenza, si raccomanda di prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*.

LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 -
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Commissione Europea

Partner:



Regione
Lombardia



Cofinanziato da:
fondazione
cariplo

In caso di mancato contatto in aree per cui sono note segnalazioni, si suggerisce di emettere il canto territoriale del maschio (massimo 1') al termine dei 10' e di restare in ascolto/osservazione per altri 5'.

LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 -
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Commissione Europea

Partner:



Cofinanziato da:

